Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons

NOM de Naissance : …… 1er PRENOM de Naissance : ……..

NOM utilisé : …… PRENOM utilisé :……

DATE de Naissance : ……..... SEXE : ……

Indication : L'auto-prélèvement est adapté à la recherche de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae.

Préconisations de recueil

Matériel :

1 Ecouvillon Aptima®. Choisir l'écouvillon en fonction de la taille du site de prélèvement.

Préparation avant le prélèvement :

- Se laver les mains avant le recueil, se déshabiller si nécessaire et s'installer dans une position confortable.
- Ouvrir l'emballage, retirer le tube de prélèvement et prendre l'écouvillon (ne pas l'humidifier).
- Réaliser le prélèvement selon les consignes ci-dessous, en fonction de la nature du prélèvement.

Modalités de prélèvement Ano-rectal :



Insérer l'écouvillon d'environ 3 à 5 cm dans le canal anal. Faire tourner doucement l'écouvillon pendant environ 5 à 10 secondes tout en le frottant contre les parois du rectum. Si l'échantillon est contaminé par d'importantes matières fécales, le jeter et répéter le prélèvement.

Modalités de prélèvement Pharyngé :



Face à un miroir, frotter l'écouvillon sur les amygdales (ou les côtés en cas d'amydalectomie) ainsi que sur le fond de la gorge, comme sur la photo ci-contre.

En cas de difficulté le prélèvement sera effectué par un personnel du laboratoire.

Traitement de l'échantillon :

Ouvrir le tube en dévissant le bouchon avec la main qui tient l'écouvillon.

Insérer l'écouvillon au fond du tube dans le milieu de transport.

Décharger pendant au moins 5 secondes puis essorer l'écouvillon sur la paroi du tube tout en remontant.

Jeter l'écouvillon dans la poubelle.

Visser hermétiquement le tube à l'aide du bouchon.

Identifiez les échantillons avec vos nom, prénom et date de naissance

Merci de renseigner les informations ci-dessous

Date / heure du recueil

……..……

Echantillon à acheminer le plus rapidement possible à température ambiante (15-25 °C).