NOM de Naissance : …… 1er PRENOM de Naissance : …….

NOM utilisé : …… PRENOM utilisé :……...

DATE de Naissance : ……..... SEXE : ……

Mode opératoire	
Conditions préalables	Il est préférable de réaliser le prélèvement avant ou à distance de l'administration d'antibiotiques.
Choix du matériel	**Pour le prélèvement bactériologique, mycologique** : 1 Ecouvillon ESwab Rose ou Orange en fonction de la taille du site de prélèvement **Pour le prélèvement de recherche de Chlamydiae et Gonocoques :** 1 Ecouvillon Aptima®. Choisir l'écouvillon en fonction de la taille du site de prélèvement.
Réalisation du prélèvement	• Insérer l'écouvillon d'environ 3 à 5 cm dans le canal anal. Faire tourner doucement l'écouvillon pendant environ 5 à 10 secondes tout en le frottant contre les parois du rectum. Si l'échantillon est contaminé par d'importantes matières fécales, le jeter et répéter le prélèvement. • Si recherche de Chlamydia ou de gonocoques prendre un écouvillon dédié. • Si recherche de Bactéries multirésistantes prendre un écouvillon dédié.
Traitement de l'échantillon	L'écouvillon est plongé dans le milieu de transport Décharger l'écouvillon puis casser la tige. Refermer de façon étanche le tube de prélèvement.
Identification des prélèvements	Identifier les prélèvements et la fiche de suivi médical selon l'instruction IT-MU0-005 « Identification des patients et des prélèvements par le préleveur ». Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.
Echantillon à acheminer le plus rapidement possible à température ambiante (15-25 °C).	

Identifiez les échantillons avec le nom, prénom et date de naissance ou

Etiquettes N° unique

Merci de renseigner les informations ci-dessous

ID Préleveur :

……

Date du recueil :

……

Heure du recueil :

……

Antibiotiques en cours :

□ Oui □ Non

Si NON date éventuelle de l'arrêt du traitement :

……

Contexte clinique :

□ Préciser :

……