LBM Canarelli Colonna Fernandez

Prélèvement vaginal et cervical – MT-MU3-026-05

Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons

NOM de Naissance : …… 1er PRENOM de Naissance : ……...

NOM utilisé : …… PRENOM utilisé :……

DATE de Naissance : ……..... SEXE : ……

Choix du matériel, Examen demandé, Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire

Examen prescrit	Nombre de prélèvements nécessaire	Matériel	Stabilité 15-25°C	Stabilité 2-8°C
☐ Cytobactériologie et Mycologie vaginale	1er écouvillon	ESwab ou	24h	24h
☐ PCR IST: *Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis*			5j	7j
☐ PCR Mycoplasmes autres : *Mycoplasma hominis, Uréaplasma uréalyticum, Uréaplasma parvum*	2ème écouvillon	ESwab ou	24h	24h
☐ PCR Herpès (HSV)	3ème écouvillon	ESwab ou	Se référer au catalogue Cerba	
☐ PCR Papillomavirus (HPV)	Flacon Anapath	Flacon THINPREP	85j	85j
☐ Examen anatomopathologique d'un Frottis cervico-vaginal			Se référer au catalogue Cerbapath	

Mode opératoire

Réalisation du prélèvement	Chez la femme enceinte il n'est pas indiqué de poser un spéculum dans les cas suivants : début de grossesse en cas d'antécédents d'accouchement prématuré, en cas de menace d'accouchement prématuré ou de rupture prématuré des membranes et le dépistage systématique du streptocoque du groupe B entre la 34ème et la 38ème semaine d'aménorrhée. Dans ces cas, insérer l'écouvillon d'environ 5 cm dans l'ouverture vaginale. Faire tourner doucement l'écouvillon pendant environ 30 secondes tout en le frottant contre les parois vaginales. Le décharger dans le milieu de transport. Puis faire en sorte que la ligne de cassure coïncide avec le bord du tube et casser l'écouvillon. Reboucher le tube. Dans les autres cas, la pose du spéculum à usage unique se fait après antisepsie des mains et port des gants. Prélever à l'aide du matériel décrit dans le tableau précédent. Décharger l'écouvillon dans le milieu de transport, casser selon le marquage et refermer. **Pour HPV et/ou Frottis Cervico vaginal** : Introduire les poils de la partie centrale de la brosse assez profondément dans le canal endocervical pour permettre aux poils latéraux, plus courts, d'entrer en contact étroit avec la région exocervicale. Pousser doucement, et tourner la brosse 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre (2,5 tours complets). Rincer la brosse dans le flacon de solution PreservCyt en la pressant 10 fois contre le fond du flacon forçant les poils à se séparer. Agiter vigoureusement la brosse pour libérer le matériel résiduel. Jeter la brosse de prélèvement. Ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon. Visser le bouchon à fond jusqu'à ce que la marque noire sur le bouchon dépasse celle présente sur le flacon.
Identification des prélèvements	Renseigner cette fiche, identifier les prélèvements et la fiche CERBA en cas d'examen d'anatomopathologie, selon l'instruction IT-MU0-005 « Identification des prélèvements par le préleveur ». Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.



Etiquette N° Unique

Identifiez les échantillons avec le nom, prénom et date de naissance

Merci de renseigner les informations ci-dessous

Date / heure du recueil

……

Température de conservation avant dépose :

□ ambiante

□ réfrigérée

Site de prélèvement :

□ endocol

□ vaginal

□ autre, préciser :

……

Antibiotiques en cours :

□ Oui □ Non

Si NON date éventuelle de l'arrêt du traitement :

……

Contexte clinique :

□ grossesse

Si OUI date prévue du terme :

……

□ leucorrhées

□ douleur, prurit, irritation

□ exploration d'hypofertilité

□ personne asymptomatique

□ infection des glandes annexes

□ autre, préciser :

……