

Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons

NOM de Naissance : 1er PRENOM de Naissance :
 NOM utilisé : PRENOM utilisé :
 Lieu de Naissance : Liste des prénoms de Naissance :
 DATE de Naissance : SEXE :

Préconisations de recueil										
SANG DANS LES SELLES										
Fournir au patient le nombre de seringues FOB et de flacons nécessaires en fonction de la prescription. <u>Recommandations générales :</u> - En cas de recherche multiple, il est recommandé de réaliser le prélèvement 3 jours consécutifs. - Utiliser de préférence des selles solides. (En cas de selles liquides, conserver le flacon d'origine et le ramener au laboratoire en respectant les délais indiqués). - Eviter les prélèvements dans tous les cas de saignements, en particulier provoqués par la constipation, les hémorroïdes ou l'administration de médicaments par voie rectale. - Périodes de règles : pas de prélèvement 3 jours avant, pendant et 3 jours après les règles. - La prise d'alcool, d'aspirine et d'autres médicaments pris en excès peuvent provoquer une irritation gastro-intestinale et entraîner des saignements occultes. La prise de ces substances doit être arrêtée au moins 48h avant le test. Pas de régime alimentaire spécifique (L'ingestion de viande ne fausse pas le test qui est spécifique de l'hémoglobine humaine). Pour effectuer le recueil : Réaliser le recueil dans le flacon bouchon rouge fournit par le laboratoire. ATTENTION les selles doivent être recueillies exclusivement à l'aide du <u>bâtonnet bleu</u>. - Dévisser le bâtonnet bleu, le sortir de la seringue. NE PAS DEVISSER LE BOUCHON BLANC. - Maintenir vertical ce bâtonnet bleu et piquer dans les selles à 3 endroits différents la partie torsadée du bâtonnet et uniquement la partie torsadée (photo ci-dessous). ATTENTION : NE PAS TROP CHARGER LE BATONNET.										
										
Identifiez les échantillons avec le nom, prénom et date de naissance ou étiquettes N° unique Merci de renseigner les informations ci-dessous <u>Date / heure du recueil</u> <u>Température de conservation avant dépose :</u> ☐ ambiante ☐ réfrigérée <u>Explorations récentes</u> type coloscopie ou biopsie transrectale : ☐ OUI ☐ NON Si oui Préciser + date : <u>Contexte clinique :</u> ☐ Fièvre ☐ Antécédents chirurgicaux digestifs ☐ Pathologies digestives ☐ Amaigrissement ☐ Sang dans les selles observé ☐ Autre contexte (si oui préciser) 										
Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Température ambiante (15-25°C)</th> <th>Température réfrigérée (2-8°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seringue FOB</td> <td>Seringue à déposer au laboratoire <3 jours</td> <td>Seringue à déposer au laboratoire dans les 3 jours</td> </tr> <tr> <td>Flacon</td> <td>Non applicable</td> <td>Flacon à déposer au laboratoire <3 jours</td> </tr> </tbody> </table> Ne jamais identifier les seringues avant d'avoir effectué le prélèvement. Identifier les prélèvements et la fiche de suivi médical selon l'instruction IT-MU0-005 « Identification des patients et des prélèvements ». Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.			Température ambiante (15-25°C)	Température réfrigérée (2-8°C)	Seringue FOB	Seringue à déposer au laboratoire <3 jours	Seringue à déposer au laboratoire dans les 3 jours	Flacon	Non applicable	Flacon à déposer au laboratoire <3 jours
	Température ambiante (15-25°C)	Température réfrigérée (2-8°C)								
Seringue FOB	Seringue à déposer au laboratoire <3 jours	Seringue à déposer au laboratoire dans les 3 jours								
Flacon	Non applicable	Flacon à déposer au laboratoire <3 jours								